

# Betaiodine®

## Spray

Polyvidone iodée

**Le geste le plus simple  
pour l'antiseptique  
le plus sûr**



flacon de 70 ml

✓ Premières urgences  
post-accidents

## Bétaiodine® spray

### Présentation du médicament :

Solution pour application cutanée, flacon pressurisé de 70 ml.

### Composition qualitative et quantitative :

Povidone iodée ..... 5 g

Excipients qsp ..... 100 g

### Indications :

- Antisepsie des plaies ou brûlures superficielles et peu étendues.
- Traitement d'appoint des affections de la peau et des muqueuses primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter.
- Antisepsie chirurgicale : préparation du champ opératoire.

Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils réduisent temporairement le nombre de micro-organismes.

### Posologie et mode d'utilisation :

- Voie cutanée.
- Pulvériser la solution sur la zone à traiter, 1 à 2 fois par jour pendant toute la durée du traitement.

### Contre-indications :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de réactions croisées avec les produits de contraste iodés. Les réactions d'intolérance (réactions anaphylactoïdes) aux produits de contraste iodés ou d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de Bétaiodine® spray.
- Enfant de moins de 1 mois.
- Utilisation prolongée pendant les 2e et 3e trimestres de la grossesse et au cours de l'allaitement.
- Antiseptiques mercuriels.

Médicament autorisé n°: 09/07P163/388