

Estogel®

Oxyde d'aluminium

Le pansement gastro-intestinal



Boîte de 24 sachets

- ✓ Œsophagites, hernies hiatales, pyrosis, dyspepsies
- ✓ Gastrites, duodinites, ulcères gastriques et duodaux
- ✓ Intolérances gastriques aux médicaments
- ✓ Séquelles de gastrectomie
- ✓ Colopathies fonctionnelles, colites

Estogel 1,2 g

Présentation du médicament :

Suspension buvable, boîte de 24 sachets-dose de 12,3 g.

Composition qualitative et quantitative :

Oxyde d'aluminium hydraté (boehmite).....8,0800 g

Soit en oxyde d'aluminium.....1,2001 g

Excipients q.s.p un sachet-dose de 12,3 g

Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-ACIDE (A : appareil digestif et métabolisme).

Dans quel (s) cas utiliser ce médicament :

Ce médicament est indiqué en cas de : douleurs, brûlures ou aigreurs de l'estomac ou de l'œsophage.

Posologie :

Un sachet au moment des douleurs, sans dépasser 6 sachets par jour.

Mode et voie d'administration :

- Voie orale.

- Absorber directement le contenu du sachet après l'avoir bien trittré.

Contre-indications :

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :

Les anti-acides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. INFORMEZ VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN DE TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS.

Par précaution, ne pas prendre au même moment l'anti-acide et un autre médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'anti-acide (par exemple 2 heures avant).

Si vous suivez un régime limité en hydrate de carbone, régime sans sucre ou régime diabétique, tenir compte de l'apport en saccharose (1,9076 g par sachet-dose).

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions avec d'autres médicaments et notamment avec les quinidiniques, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

- L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.
- L'allaitement peut être poursuivi lors de ce traitement.
- Eviter les prises prolongées et à fortes doses de ce médicament.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSE呆 OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans

risque chez certains patients :

- Teneur en saccharose : 1,9076 g par sachet-dose.
- Parahydroxybenzoate de méthyle sodé
- Parahydroxybenzoate de propyle sodé
- Sorbate de potassium

Effets non souhaités et gênants :

- Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Troubles du transit (constipation).
- En cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses, une diminution du taux de phosphore dans le sang peut survenir.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

Conservation :

02 ans.