

Laxel[®]

Hydroxyde de magnésium

**Le laxatif
aux vertus
magnésiennes**



Boite de 14 sachets

Le magnésium:

- ✓ **Laxatif osmotique salin**
- ✓ **L'hydroxyde de Mg est l'antidote de tous les poisons acides**

Laxel® 4,9 g

Présentation du médicament :

Poudre pour suspension buvable, boîte de 14 sachets-dose.

Composition qualitative et quantitative :

Hydroxyde de magnésium.....4,9 g

Excipients qsp un sachet-dose5 g

Classe pharmaco-thérapeutique :

Laxatif osmotique stimulant (A : appareil digestif et métabolisme).

Dans quel (s) cas utiliser ce médicament :

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation.

Posologie :

- Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.
- Un (01) sachet-dose le soir au coucher ou le matin à jeun.
- Le traitement doit être de courte durée (de 8 à 10 jours maximum).

Mode et voie d'administration :

- Voie orale.
- Dissoudre le contenu du sachet dans un verre d'eau.

Contre indications :

- Insuffisance rénale sévère.
- Maladies inflammatoires du colon (rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn).
- Syndrome occlusif ou subocclusif.
- Enfant de moins de 12 ans (sauf prescription médicale).

EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :

- Une utilisation prolongée (supérieure à 8 jours) est déconseillée.
- En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, la prise du produit doit être arrêtée.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions avec d'autres médicaments, et notamment avec les antiarythmiques, les digitaliques et les hypokaliémiants, **SIGNELEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

Grossesse et allaitement :

Ce médicament est déconseillé sans avis médical pendant la grossesse et l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Effets non souhaités et gênants :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes

entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Dans certains cas, la prise du produit peut être suivie, notamment chez les sujets souffrant de colon irritable, de douleurs abdominales et de diarrhée.
- La prise prolongée peut entraîner une irritation colique réalisant au maximum la colite des laxatifs (avec troubles électrolytiques, en particulier hypokaliémie).

SIGNELEZ À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

Conservation : 02 ans.

Médicament autorisé n° : 09/10L186/388