

Hysalox®

Hydroxyde d'aluminium, hydroxyde de magnésium

1- Identification du médicament :

a) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE PAR SACHET-DOSE:

Hydroxyde d'aluminium 525 mg

Hydroxyde de magnésium 600 mg

Excipients q.s.p un sachet-dose: saccharose, povidone, hydroxyéthylcellulose, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, parahydroxybenzoate de propyle sodé, composition aromatique (arôme banane), eau purifiée.

b) FORME PHARMACEUTIQUE :

Suspension buvable. Boîte de 30 sachets-dose.

c) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antiacide (A : appareil digestif et métabolisme)

d) NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT ET DU FABRICANT :

Laboratoires hysa, Z.I n° 107, Sidi bel Abbès 22000 Algérie- BP 182/08.

2- Dans quel cas utiliser ce médicament :

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées acides.

3- Comment utiliser ce médicament :

a) POSOLOGIE : RESERVE A L'ADULTE A PARTIR DE 15 ANS.

1 sachet au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, sans dépasser 6 sachets par jour.

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale.

Bien triturer le sachet avant ouverture et absorber la suspension telle quelle, sans la diluer.

c) DUREE DU TRAITEMENT :

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

4- Attention :

a) CONTRE INDICATIONS :

-Antécédents d'allergie à l'un des composants du médicament.

-Maladie grave du rein.

b) MISES EN GARDE :

Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin:

-Si vos troubles sont associés à une perte de poids.

-Si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante.

-Si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment.

-Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale) ou si vous êtes dialysé, vous devez consulter un médecin car HYSALOX® contient de l'aluminium et du magnésium.

-Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héreditaire rare).

-Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héreditaires rares).

-Ce médicament contient du sorbate de potassium, du parahydroxybenzoate de méthyle sodé et du parahydroxybenzoate de propyle sodé, et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

c) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

EN CAS DE DOUTE, A NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Les antiacides diminuent la résorption digestive de certains autres médicaments ingérés simultanément.

Par mesure de précaution, il convient de prendre HYSALOX® à distance des autres médicaments (plus de 2 heures, si possible).

SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

e) GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

L'utilisation du médicament est possible pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

f) LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE (quantité/sachet-dose) : Saccharose (1,5g), Sorbitol (0,283 g), Sorbate de potassium (0,02g), Parahydroxybenzoate de méthyle sodé (0,03g), Parahydroxybenzoate de propyle sodé (0,005g).

5- Effets non souhaités et gênants :

Concernant tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants. Possibilité de :

- Troubles du transit (diarrhée ou constipation).
 - Diminution du taux de phosphore dans le sang en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses.
- SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6- Surdosage :

Si vous avez pris plus d'Hysalox®, suspension buvable que vous n'auriez dû:

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Le surdosage de magnésium par voie orale n'entraîne pas, en général, de réactions toxiques en cas de fonctionnement normal du rein. L'intoxication au magnésium peut toutefois, se développer en cas d'insuffisance rénale.

7- Conservation :

- Pas de précautions particulières de conservation.

- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

- Ne pas laisser à la portée des enfants.

8- Date de révision de la notice : Avril 2014.

هيزالوكس

هيدروكسيد الألومنيوم، هيدروكسيد المغزنيوم

هيزالوكس

هيدروكسيد الألومنيوم، هيدروكسيد المغزنيوم

1- التعريف بالدواء:

(ا) التركيب النوعي والكمي:

كل كبس يحتوي على كبس جرعة.

هيدروكسيد الألومنيوم..... 525 mg

هيدروكسيد المغزنيوم..... 600 mg

ساق كبس. كبس جرعة: 30 كبس جرعة.

(ب) الشكل الصيدلي والعبوة:

معلق شراب. معلق جرعة.

(ج) الزمرة الدوائية:

مضاد الحموضة (أ) الجهاز الهضمي والمستقل.

(د) اسم و عنوان المستقل والمتنفذ:

مخابر هزا - المنطة الصناعية رقم: 107، سيدى بلعباس 22000 الجزائر. ص.ب.182/08.

(- الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء (الاستثناءات):

يستعمل هذا الدواء لدى المرضى (منذ سن 15 سنة) في علاج حالات الحرقه والحموضة المعوية.

(- كيف يستعمل هذا الدواء:

(ا) المقاومون: مخصوص للبالغين منذ من 15 سنة.

كبس عند الشعور بالحرقة أو الحموضة المعوية، دون تجاوز 6 أكياس في اليوم.

(ب) كيفية الاستعمال: يعطى عن طريق الفم.

يجب بلع محتوى الكبس مباشرة من الكبس بعد دفعه جيدا.

(ج) مدة العلاج: تقتصر مدة الاستعمال إلى 10 أيام.

4- نتائج:

(ا) الحالات التي لا يستعمل فيها هذا الدواء:

- مسوقة حساسية ضد أحد مكونات هذا الدواء.

- يمنع استعمال هذا الدواء في حالة النصور الكلوي الحاد.

عند الشك فإنه من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

(ب) تحذيرات خاصة:

لا يمكن استعمال هذا الدواء إلا بعد استشارة الطبيب.

- إذا كانت اضطرابات مرقة يفعلن في الوزن.

- إذا كانت تعانى من صعوبة في الزفير أو ازتعان بطنى مستمر.

- إذا كانت تعانى من سوء التصيم للقولون الراقي أو إذا تغير هذه الاضطرابات في الفترة الأخيرة.

- إذا كان لديك مرض الكلى (قصور كلى) أو كنت تخضع لغسيل كلى، يجب استشارة الطبيب لأن هيزالوكس يحتوى على الألومنيوم والمنغنيزوم.

قد يسبب هذا الدواء على مرضى عصبية خطيرة (الاعتلال الدماغي).

- هذا الدواء يحتوى على سوريبيتون، لذا لا يسمى باستعماله عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفروتكوز (مرض وريانى نادر).

- هذا الدواء يحتوى على السكاراز، لذا لا يسمى باستعماله عند المرضى في حالة عدم تحمل الفروتكوز، سوء امتصاص الغلوكوز أو الغلاكتوز أو نقص في السكراز- إيزومالتاز.

- هذا الدواء يحتوى على 1.5٪ من السكاراز، لذا يجبأخذ هذه الكمية بعين الاعتبار في الوجبة الغذائية اليومية، في حالة اتباع نظام غذائي قليل السكريات أو في حالة مرض السكري.

- يحتوى هذا الدواء على سوربات البوتاسيوم، مثيل البرابين الصودي، بروبيل البرابين الصودي و تراكم الألومنيوم والمنغنيزوم.

(ج) احتياطات خاصة:

إذا كانت شدة / أو تكرر الأعراض مستمرة من دون تحسن أو تسوء بعد 10 أيام من العلاج، لا تزيد في الجرعة بل يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

عند الشك، يجب عدم التردد في استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

(د) التناقضات والارتجاعات غيرها من التناقضات:

يمكن تناول المضادات الحموضة القابل من تناول آلام آخرى أخرى.

يتمادي آباء تناولات دوائية مختلفة، يتجنب عدم تناول مضاد الحموضة و دواء آخر معًا، بل يستحسن أن يفصل بين تناولهما مدة زمنية (ساعتان إن أمكن).

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلاني عن كل علاج آخر قد يتلقى التناول.

(ه) الحمل والارضاع:

يستخدم هذا الدواء أثناء الحمل فقط بناء على صحة الطبيب.

يمكن تناوله الإرضاع مع تناول هذا الدواء.

يسمى عامة، يجب دائماً استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول آية لدواء أثناء فترة الحمل والارضاع.

(و) بيان بالسواء الواجب معرفتها من قبل بعض المرضى لمعالجه بدون خطر(الكمية في كل كبس جرعة):

السكارازون (5,5٪) 0,283 (ع) مثيل البرابين الصودي (0,03, ع) بروبيل البرابين الصودي (0,005, ع).

(- التناقضات الغير مرغوبة والمحظوظة:

كل مادة فعالة، قد يسبب هذا الدواء بعد بعض الأشخاص تناقضات نوعاً ما مزاجة. احتمال:

قد يصلح تناقض في مستحضر فموغر الدم في حال تناول الدواء لمدة طويلة أو بجرعات عالية.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلاني عن كل ظاهرة غير مرغوبة أو مزعجة قد تكون غير مذكورة في هذه النشرة.

(- الإفراط في الجرعات:

إذا كنت قد أخذت أكثر مما يلزم من هيزالوكس من ملعقة للشرب، يجب عليك:

استشارة طبيب أو الصيدلاني.

الجرعات المغفرطة من المنغنيزوم عن طريق الفم لا تسبب عادة في تفاعلات سامة إذا كانت وظائف الكلى طبيعية. ومع ذلك، التسمم من المنغنيزوم ، قد يحدث عند المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي.

7- حفظ الدواء:

لا توجد احتفاظات خاصة لحفظ.

يجب عدم استعماله بعد انتهاء الصلاحية المذكورة على الكبس.

لا يترك في متناول الأطفال.

8- تاريخ مراجعة النشرة: أبريل 2014.